



SIMPÓSIO PARAIBANO DE
MEDICINA
DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

PAINEL INTEGRADO DE
MEDICINA



Medicina

Anais

02, 03 e 04
JUNHO



BRAZILIAN
ARCHIVES OF
**HEALTH AND
ENVIRONMENT**

ISSN: 2675-2298



PATOS-PB
2022



<https://bahe.unifip.edu.br>



ORGANIZAÇÃO GERAL

Coordenação do Núcleo de Práticas Investigativas em Saúde
Coordenação do Programa de Acompanhamento de Egressos

COMISSÃO ORGANIZADORA

Profª Dra Milena Nunes Alves de Sousa – UNIFIP
Prof Me Umberto Marinho de Lima Júnior – UNIFIP
Prof Me Miguel Aguila Toledo – UNIFIP
Prof Dr Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira - UNIFIP
Prof Me Francisco Orlando Rafael Freitas
(Organizadores)




<https://bahe.unifip.edu.br>



COMISSÃO CIENTÍFICA

Prof Dr Fabrício Kleber de Carvalho
Prof Dr Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira
Profª Drª Milena Nunes Alves de Sousa
Profª Drª Raquel Bezerra de Sá de Sousa Nogueira
Prof Me Francisco Orlando Rafael Freitas
Prof Me Everson Vagner de Lucena Santos
Prof Me Miguel Aguila Toledo
Prof Dr Vamberto Fernandes Spinelli Junior
Prof Esp Nilson Neto de Araújo Moraes
Profª Esp Thuany Rodrigues Dias
Profª Esp Marriane Brito Macedo
Profª Ma Hirisleide Bezerra Alves
Profª Ma Charlene de Oliveira Pereira
Profª Esp Luana Idalino da Silva
Profª Esp Isadélia Constâncio de Oliveira
Profª Ma Larissa de Araújo Batista Suárez
Profª Drª Nara Maria Holanda de Medeiros



**BRAZILIAN
ARCHIVES OF
HEALTH AND
ENVIRONMENT**

BAHE – Brazilian Archives of Health and Environment, v. 3, n. esp. 1 (2022): 64-120.

ISSN: 2675-2298

<https://bahe.unifip.edu.br>

Apresentações em Pôster

6°

SIMPÓSIO PARAIBANO DE
MEDICINA
DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

PAINEL INTEGRADO DE
MEDICINA

1º ENCONTRO DE
EGRESSOS

02, 03 e 04
JUNHO

AUDITÓRIO MASTER | BLOCO G

FORMAÇÃO E RESILIÊNCIA NA EDUCAÇÃO MÉDICA



SUMÁRIO

- INFLUÊNCIA DAS IST NA SAÚDE SEXUAL DE PROFISSIONAIS DO SEXO
- QUANDO O SABONETE DE AROEIRA FUNCIONA: CRESCERFITOTERAPIA NA COMUNIDADE, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
- O PODER DO LAMBEDOR: CRESCERFITOTERAPIA NA COMUNIDADE, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
- A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO PNEUMOCÓCICA EM CRIANÇAS
- A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCE DA DOENÇA DE CHAGAS NA PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES CRÔNICAS
- A IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS DE CONTROLE PARA O DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA
- ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE TUBERCULOSE NA PARAÍBA NO PERÍODO DE 2018 a 2021
- EFEITOS SISTÊMICOS DA DOENÇA MÃO-PÉ-BOCA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES INFECTADOS
- USO DE BENZODIAZEPÍNICOS ENTRE INDIVÍDUOS COM ANSIEDADE E/OU DEPRESSÃO EM PATOS-PB: ESTUDO ECOLÓGICO
- CAPACITANDO CIDADÃOS EM NOÇÕES BÁSICAS DE EMERGÊNCIA
- COMPLICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DE ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES NO MANEJO CLÍNICO DA DENGUE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
- COMPLICAÇÕES DA INFECÇÃO DE HISTOPLASMOSE EM PACIENTES COM O VÍRUS DA AIDS NO BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
- CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE FISIOLOGIA ATRAVÉS DA MODALIDADE MONITORIA
- EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DA ANFOTERICINA B EM PACIENTES COM HISTOPLASMOSE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
- EFEITOS SISTÊMICOS DA DOENÇA MÃO-PÉ-BOCA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES INFECTADOS



SUMÁRIO

- ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS PARA INFECÇÕES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTES À METICILINA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
- EXPOSIÇÃO INTRAUTERINA A DISTÚRBIOS HIPERTENSIVOS DA GESTAÇÃO: EFEITOS NO CRESCIMENTO PÓS-NATAL EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS.
- FATORES DE MULTIRRESISTÊNCIA EM CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM AMBIENTES HOSPITALARES
- IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS SÍNDROMES GENÉTICAS NA CIDADE DE PATOS-PB
- A IMPORTÂNCIA DAS MONITORIAS PARA OS MONITORADOS E MONITORES: RELATO DE EXPERIÊNCIA
- INCIDÊNCIA DA DEPRESSÃO EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA
- MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO TERRITORIAIS PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E RISCO DE OBESIDADE COM USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS
- OS IMPACTOS DO HIV NA QUALIDADE DE VIDA DOS INDIVÍDUOS INFECTADOS DE FORMA TRANSVERSAL
- OS POSSÍVEIS RISCOS DA ADMINISTRAÇÃO DO ALBENDAZOL NO TRATAMENTO DA CISTICERCOSE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
- PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CENÁRIO DA ONCOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
- PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À OBESIDADE INFANTIL: REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE
- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MAMANGUAPE (PB): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
- RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO INFANTIL E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
- RELATÓRIO SOBRE O ASPECTO DA MONITORIA DE HISTOLOGIA APLICADA NAS MINI OSCES



SUMÁRIO

- DISBIOSE INTESTINAL COMO UM FATOR CONTRIBUINTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEPSE EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS
- A CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA ACADÊMICA PARA O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DA CITOGENÉTICA
- O IMPACTO DO ENSINO BASEADO EM SIMULAÇÃO CIRÚRGICA NA FORMAÇÃO MÉDICA
- A NECESSIDADE DAS CONSULTAS DE PUERICULTURA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SERTÃO PARAIBANO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
- A FUNÇÃO DA ZONULINA NA PERMEABILIDADE INTESTINAL
- A IMPORTÂNCIA DA CONSULTA PEDIÁTRICA NO PRÉ-NATAL
- A IMPORTÂNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA MANOBRA DE HEIMLICH NA PREVENÇÃO DE ÓBITOS EM CASOS DE ENGASGO EM CRIANÇAS
- SALA DE ESPERA COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CAMPO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER
- SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ: EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE OS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DE LONGA DURAÇÃO
- SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO ENSINO DE HUMANIDADES POR ESTUDANTES DE MEDICINA DO UNIFIP
- SÍNDROME DE GARDNER-DIAMOND: UMA ASSOCIAÇÃO COM OS TRANSTORNOS MENTAIS
- TOXOPLASMOSE NA GRAVIDEZ: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL E TRATAMENTO
- USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA PREVENÇÃO DA ENXAQUECA
- VARÍOLA DOS MACACOS EM HUMANOS: ABORDAGEM DOS RISCOS DO SURGIMENTO DE EPIDEMIAS
- IMPACTOS DA COVID-19 EM PESSOAS COM A SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA
- EVIDÊNCIAS DO USO DA ADRENALINA NO MANEJO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM ADULTOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA



TRABALHOS PREMIADOS



1o LUGAR:

Sentidos atribuídos ao ensino de humanidades médicas por estudantes de medicina do UNIFIP

Vamberto Fernandes Spinelli Junior, Gabryela Canuto Nepomuceno & Maria Jamilly Batista Santos

Uso de benzodiazepínicos entre indivíduos com ansiedade e/ou depressão em Patos-PB: estudo ecológico

Monalisa Maria de Souza Fernandes Paulo, João Eduardo Miranda Lima, Luana Meireles Percoraro, Fabíola Gabriellen de Barros Brito, Luiz Henrique Celestino Camboim Sousa, Flávia Thalia Guedes Farias & Milena Nunes Alves de Sousa



2o LUGAR:

Programa de assistência farmacêutica, plantas medicinais e fitoterápicos nos serviços de saúde de Mamanguape (PB): um relato de experiência

Miriam de Andrade Brandão, Eulâmpio Dantas Segundo, Janaína Lúcio Dantas, Maria Fernanda Fontes de Paula Castanho, Regina Keiko Sato Mizuno Filha & Audrey Vinnícios Antunes Tavares

A necessidade das consultas de puericultura em uma unidade básica de saúde do sertão paraibano: um relato de experiência
Aline Tavares de Oliveira & Milena Nunes Alves de Sousa



3o LUGAR:

Uso da toxina botulínica na prevenção da enxaqueca

Livia Layanne Lopes Fernandes Rodrigues, Eduarda Feitosa Bezerra, Antonio Campos de Sousa Filho, Laura Mourão Aragão, Daniella Ribeiro Benício Alexandre & Milena Nunes Alves de Sousa





INFLUÊNCIA DAS IST NA SAÚDE SEXUAL DE PROFISSIONAIS DO SEXO

Luiz Henrique Celestino Camboim Sousa, Monalisa Maria de Souza Fernandes
Paulo, Giovanna Kailany Machado de Oliveira Moura, Francisco de Assis
Remigio III, Antonio Reney Beserra de Araujo & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A população de mulheres trabalhadoras do sexo no Brasil é de 0,8% entre 15 e 49 anos, sendo essas pessoas mais vulneráveis às situações de infecções sexualmente transmissíveis (IST), devido às repetidas violações dos direitos humanos, ao pouco conhecimento relacionado à sexualidade, ao limitado acesso aos anticoncepcionais e à falta de autonomia em insistir pelo uso de preservativos. Assim, todas essas situações contribuem diretamente para uma diminuta saúde sexual desse grupo populacional. **Objetivo:** Abordar as influências das IST na saúde sexual de profissionais do sexo. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática composta de 14 artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando como descritores: “IST”, “Saúde sexual” e “Profissionais do sexo”. Empregou-se como critérios de inclusão: artigos em inglês e português, além texto de completo publicados entre 2017 e 2022 e como língua de origem. **Discussão:** A taxa de HIV de mulheres profissionais do sexo é 13 vezes maior do que aquelas que não possuem essa profissão, realçando a morbidade presente nesse grupo social e a necessidade de uma atenção maior para a sua condição de saúde. As dificuldades encontradas por essas pessoas são aquelas relacionadas aos cuidados em saúde sexual e reprodutiva, à vergonha de buscar ajuda e à falta de métodos contraceptivos que atenuam a constante presença de IST nesse grupo. **Conclusão:** A presença de IST na vida de profissionais do sexo interferem diretamente na sua saúde sexual, necessitando de medidas mais abrangentes de prevenção e de atenção aos seus direitos sexuais e reprodutivos.

Palavras-chave: IST; Profissionais do sexo; Saúde sexual.



QUANDO O SABONETE DE AROEIRA FUNCIONA: CRESCERFITOTERAPIA NA COMUNIDADE, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Rebeca Bezerra de Sá de Sousa Nogueira, Luana Meireles Percoraro, Livia Dantas Fragoso, Kelson Breno Lima Brasileiro, José Ytalo de Figueiredo Alves Campos & Tiago Bezerra de Sá de Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Demonstrar através do relato de experiência o quanto importante é nossa interação com a comunidade através do nosso projeto de extensão Crescerfitoterapia na comunidade, em especial nas unidades básicas de saúde. Metodologia: foram utilizados conhecimentos teórico-práticos sobre plantas medicinais e Fitoterapia nas comunidades, a nível das Unidades Básicas de Saúde que possuam estudantes ou residentes de Medicina vinculados à UNFIP em diferentes bairros no município de Patos-PB, abrangendo usuários do SUS com cadastro nas UBS (Unidades Básicas de Saúde). Resultado: Pudemos constatar o uso de plantas medicinais contidas na lista do SUS como estratégia para redução de custos, tratamento mais natural e redução na espera para início do tratamento. Realizamos ações que aproximaram a fitoterapia da comunidade, através de palestras e distribuição de materiais de apoio e sabonetes de aroeira. Tivemos inúmeros relatos de melhora de patologias, dentre eles o de um paciente acometido da doença mão- pé-boca, que já havia usado inúmeros medicamentos e teve a melhora após 4 semanas de uso do sabonete, com o devido acompanhamento de estudantes de Medicina nessa comunidade. Conclusão: assim, temos acompanhado a cada dia a evolução dos nossos alunos de medicina e o crescimento da comunicação com a comunidade, usando a fitoterapia como ciência que realmente funciona nas UBS.

Palavras-Chave: Crescerfitoterapia, sabonete de aroeira, plantas medicinais, Unidades Básicas de Saúde.

O PODER DO LAMBEDOR: CRESCERFITOTERAPIA NA COMUNIDADE, UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Débora Oliveira dos Santos, Emídio José de Souza, Lorena Pereira Viana,
Nadigerlane Rodrigues de Carvalho Almeida Guedes & Tiago Bezerra de Sá de
Sousa Nogueira

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: evidenciar, por meio do relato de experiência o quão importante é nossa interação com a comunidade, através do nosso projeto de extensão Crescerfitoterapia na comunidade, em especial nas unidades básicas de saúde. Metodologia: utilização de conhecimentos teórico-práticos sobre plantas medicinais e Fitoterapia nas comunidades a nível das Unidades Básicas de Saúde que possuam estudantes ou residentes de Medicina vinculados à UNFIP em diferentes bairros no município de Patos-PB, abrangendo usuários do SUS com cadastro nas UBS (Unidades Básicas de Saúde). Resultado: Experimentamos o uso de plantas medicinais contidas na lista do SUS como estratégia para redução de custos, tratamento mais natural e redução na espera para início do tratamento. Fizemos apresentações que aproximaram a fitoterapia da comunidade, através de palestras e distribuição de materiais de apoio e lambedor. Tivemos inúmeros relatos de melhora de patologias, dentre eles o de um paciente que tossia muito com peito cheio de secreção há mais de 3 meses, sem conseguir resolver com antibióticos e com o uso em uma semana, tanto expectorou todo o muco contido em seus pulmões como não adoeceu mais de nenhuma enfermidade de vias respiratórias. Conclusão: portanto, temos seguido a cada dia a evolução dos nossos alunos de medicina e observado o crescimento da comunicação com a comunidade, usando a fitoterapia como ciência que realmente funciona nas UBS, curando pessoas das mais diversas idades.

Palavras-Chave: Crescerfitoterapia, lambedor, plantas medicinais, Unidades Básicas de Saúde.



A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO PNEUMOCÓCICA EM CRIANÇAS

Ohara Nayanne Nunes Pereira Inácio de Queiroz, Giovanna Kailany Machado de Oliveira Moura, Maria Alexandra Pereira Souza & Umberto Marinho de Lima Júnior

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A pneumonia é uma das principais razões para admissão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ventilação mecânica e morte entre crianças, sobretudo com menos de 5 anos em todo o mundo. Diante disso, existem ações que visam fatores de proteção para elas, como, por exemplo, as imunizações adequadas. Entre os fatores de risco para essa patologia estão o sexo (masculino) e idade, que variam entre as diferentes comunidades. Nos países desenvolvidos as taxas de mortalidade são baixas, porém a morbidade por pneumonia mantém-se alta. **Objetivo:** Analisar e compreender as causas de pneumonia em crianças e a importância da vacinação contra o pneumococo. **Métodos:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos bancos de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), do Pubmed e do Scielo, entre os períodos de 2015 a 2019, havendo seleção de 4 artigos após aplicação do critério, o qual foi estar relacionado o tema específico. **Resultados:** É possível perceber, diante das pesquisas feitas, que a idade como fator de risco explica porque houve a associação com o não cumprimento do esquema vacinal, pois ocorreu diminuição da porcentagem de adequação do calendário à medida em que a faixa etária aumentava. Ademais, sabe-se que o sexo como fator de risco para a pneumonia ainda não está totalmente esclarecido, entretanto, foi estudado que o sexo feminino tem uma melhor resposta da imunidade. **Considerações finais:** Esse estudo proporcionou uma ampla visão acerca da importância da vacinação como fator de proteção para a saúde das crianças, a qual pode atenuar casos consideráveis de internações, mortes por pneumonias pediátricas, e, além disso, evitar que possa evoluir para complicações.

Descritores: Pneumonia. Fator de risco. Criança. Vacinação.



A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PRECOCE DA DOENÇA DE CHAGAS NA PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES CRÔNICAS

Giovanna Kailany Machado de Oliveira Moura, Monalisa Maria de Souza
Fernandes Paulo, Luiz Henrique Celestino Camboim, Antônio Reney Beserra de
Araújo, Francisco de Assis Remígio III & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma doença infecciosa ocasionada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, caracterizada, na fase aguda, por sintomas como febre, mal estar e falta de apetite. Trata-se de uma doença classificada por alta morbimortalidade, haja vista que, quando não tratada adequadamente, possui graves implicações crônicas, como insuficiência cardíaca e/ou digestivas. **Objetivo:** Apresentar a importância do diagnóstico e do tratamento precoces da Doença de Chagas na prevenção de complicações a longo prazo. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática, a partir de dados de artigos indexados no Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Estes foram selecionados a partir da utilização dos Descritores em Ciências da Saúde “Chagas” AND “Diagnóstico” AND “Tratamento”, a partir dos quais foram empregados os critérios de inclusão: texto completo, tipo de estudo “estudo diagnóstico”, escritos em inglês e publicados entre 2017 e 2022. A amostra final foi composta por 28 artigos. **Resultados:** O diagnóstico da DC é realizado através de testes sorológicos, complementados por testes parasitológicos e moleculares. Já o tratamento, é feito pelo uso de antiparasitários. Pacientes que possuem diagnóstico precoce e realizam o tratamento de forma adequada em tempo hábil têm menos chances de evoluírem para complicações que caracterizam o quadro crônico da DC, como cardiomegalia, hepatoesplenomegalia e manifestações neurológicas. **Conclusão:** É de suma importância que o diagnóstico e o tratamento da Doença de Chagas ocorram de forma breve e eficiente, visto que podem prevenir óbitos decorrentes de quadros graves ocasionados pelas complicações supracitadas.

Palavras-chave: Diagnóstico; Terapia; Cronicidade; Complicações.

A IMPORTÂNCIA DOS PROGRAMAS DE CONTROLE PARA O DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA

José Brunuelisson Cavalcante Silva, Jose Ytalo de Figueiredo Alves Campos,
Mayara Nóbrega Araújo, Wândyna Braga de Oliveira & Hirisleide Bezerra
Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Pontuar os principais programas que atuam no diagnóstico e prevenção da toxoplasmose congênita. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa com busca nas bases de dados do PUBMED e SCIELO, utilizando-se como Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) "Toxoplasmose congênita", "Profilaxia" e "Diagnóstico". Os critérios de inclusão compreenderam artigos em português e inglês, relacionados ao tema e publicados no período de 2018 a 2022. **Resultados:** A triagem sorológica materna para detecção da toxoplasmose destaca-se como principal medida profilática no diagnóstico da toxoplasmose congênita. Constitui uma importante ferramenta que permite a adoção de medidas profiláticas e terapêuticas precocemente e, assim, a diminuição da taxa de transmissão vertical e/ou danos ao desenvolvimento fetal. Programas de triagem neonatal englobam o diagnóstico da infecção pela detecção de IgM específico para o toxoplasma no "teste do pezinho". No Brasil, a triagem pré-natal é sugerida como política pública não obrigatória devido à elevada prevalência da toxoplasmose materna (superior a 40%), sendo oferecida gratuitamente em algumas regiões, com experiência isolada e protocolos próprios, mas sem uniformidade nas ações. **Conclusão:** Devido os meios de diagnóstico para toxoplasmose materna, fetal e neonatal serem de alta complexidade e de difícil interpretação, aliado a não existência da padronização de técnicas, quadro clínico inespecífico e a falta de conhecimento das limitações das diversas técnicas de detecção de anticorpos, verifica-se uma maior dificuldade para diagnóstico. Logo, a variação de incidência e prevalência está relacionada com os hábitos alimentares, contato com a terra, presença de gatos, ruralização das moradias e outros fatores de risco.

Palavras-chave: Toxoplasmose Congênita; Profilaxia; Diagnóstico.

ABORDAGEM EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE TUBERCULOSE NA PARAÍBA NO PERÍODO DE 2018 A 2021

Anna Camilla Ferreira Lopes Valério Pinto, Vinícius Marques Andrade &
Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Abordar os dados epidemiológicos da tuberculose no estado da Paraíba no período de 2018 a 2021. Método: Realizou-se um levantamento dos dados epidemiológicos da tuberculose na Paraíba (PB) a partir da plataforma do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2018 a 2021. As informações foram correlacionadas com dados expostos em artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Resultados: No Brasil, até 2019, a tuberculose (TB) ocupava o primeiro lugar no ranking das doenças de maior mortalidade por um único agente infeccioso, com perspectiva de aumento nos anos seguintes. Diferentemente dos padrões nacionais, na Paraíba verificou-se diminuição da incidência desde 2018, com 32,7 casos por 100 mil habitantes no respectivo ano, 31,6 em 2019, 28,3 em 2020, e 25,4 em 2021. Acrescenta-se o aumento de 3,6/100 mil no índice de cura desde 2018 e diminuição do índice de mortalidade em 0,4/100 mil nesse mesmo período, demonstrando uma evolução positiva no combate a TB. A taxa de abandono do tratamento aumentou em 1,0 casos/100 mil desde 2019, mas é necessário considerar a pandemia. Conclusão: No período exposto, verificou-se uma redução dos casos de TB na Paraíba, com melhora dos índices de cura e mortalidade. Entretanto, ressalta-se que mais de 100 notificações não tiveram seu desfecho informado em 2020, interferindo nos resultados, sendo necessário conscientizar as secretarias de saúde sobre a importância da finalização das notificações. O estímulo ao tratamento diretamente observado é outra medida que pode melhorar o indicador de abandono dos pacientes ao tratamento.

Palavras-chave: Tuberculose; Dados epidemiológicos; Paraíba.

EFEITOS SISTÊMICOS DA DOENÇA MÃO-PÉ-BOCA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES INFECTADOS

Francisco de Assis Remigio III, Monalisa Maria de Souza Fernandes Paulo, Luiz Henrique Celestino Camboim Sousa, Giovanna Kailany Machado de Oliveira Moura, Antonio Reney Beserra de Araujo & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A doença mão-pé-boca (DMPB) pertence a família do enterovírus e é um agravo contagioso causado pelo vírus Coxsackie A16. Essa enfermidade tem como maior público afetado crianças por volta de 5 anos de idade, mas também pode acometer adultos. Além disso, a principal manifestação cutânea desse vírus são lesões vesiculobolhosas disseminadas e distribuídas principalmente na mucosa oral e língua, palmas das mãos e plantas dos pés e eventualmente órgãos genitais. Seu contágio é por contato direto e uso de objetos contaminados. **Objetivo:** Apresentar os efeitos sistêmicos ocasionados pela doença mão-pé-boca e seu impacto na qualidade de vida de pessoas infectadas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática composta de 16 artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando como descritores: “Enterovirus”, “Fatores de Risco” e “Qualidade de vida”. Empregou-se como critérios de inclusão: texto completo, publicados entre 2017 e 2022. **Discussão:** Há uma restrita relação entre a DMPB e a má QVRS no que se refere ao aparecimentos das lesões dermatológicas. Alguns dos sintomas dessa doença incluem máculas vermelhas na boca, amídalas e faringe que podem evoluir para ulcerações dolorosas, além de dificuldade de deglutição e excesso de salivação, ocasionada pela constante dor. Por isso, é evidenciado que além das várias lesões de pele, os enfermos podem apresentar anorexia e perda de peso no período das lesões. **Conclusão:** A DMPB, a partir de seus efeitos sistêmicos e sintomas, provocam uma série de dificuldades no dia a dia de pessoas acometidas com essa doença, resultando em uma diminuição na qualidade de vida daqueles que a possuem.

Palavras-Chave: Doença mão-pé-boca; efeitos sistêmicos; qualidade de vida.

USO DE BENZODIAZEPÍNICOS ENTRE INDIVÍDUOS COM ANSIEDADE E/OU DEPRESSÃO EM PATOS-PB: ESTUDO ECOLÓGICO

Monalisa Maria de Souza Fernandes Paulo, João Eduardo Miranda Lima, Luana Meireles Percoraro, Fabíola Gabriellen de Barros Brito, Luiz Henrique Celestino Camboim Sousa, Flávia Thalia Guedes Farias & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: É notório o aumento do uso crônico e indiscriminado de benzodiazepinas pela população em geral, com estudos indicando que a prevalência varia de 7,3%, a 63,8%. Portanto, o uso da medicação na América Latina é bastante alto, principalmente em mulheres, somado ao fato de que a automedicação também é um fator presente. **Objetivo:** Analisar o uso de benzodiazepinas em indivíduos com ansiedade e/ou depressão na atenção primária do município de Patos-PB. **Métodos:** Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo e ecológico realizado nas Unidades Básicas de Saúde do município de Patos. Foram incluídos usuários crônicos de benzodiazepinas (> 3 meses) e cadastrados na Estratégia de Saúde da Família patoense; excluíram-se pacientes com faixa etária <18 anos. Utilizou-se o questionário social e demográfico e a Escala de Avaliação do Nível de Ansiedade e Depressão, validada no Brasil. **Resultados:** 77 pacientes foram incluídos no estudo. Destes, 81,7% eram do sexo feminino, 29,6% com faixa etária de 48 a 57 anos e 35,2% com ensino fundamental I incompleto. Verificou-se que 46,5% dos pacientes pontuaram entre 12 e 21 pontos na Escala. **Conclusão:** A prevalência de uso de benzodiazepinas foi considerada elevada e a baixa escolaridade e o sexo feminino, podem se configurar como fatores de risco à utilização crônica. Soma-se o fator iatrogênico, haja vista que as medicações não estão compensando o quadro ansioso dos pacientes avaliados.

Palavras-Chave: Receptores de GABA-A; Ansiedade; Depressão; Atenção Primária à Saúde.



CAPACITANDO CIDADÃOS EM NOÇÕES BÁSICAS DE EMERGÊNCIA

Flávia Thalia Guedes Farias, Emídio José de Souza & Umberto Marinho de Lima
Júnior

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: relatar a experiência dos acadêmicos extensionistas no projeto “Promovendo ações em saúde através do comitê local da IFMSA Brazil UNIFIP” em atividade de educação em saúde sobre Suporte Básico de Vida para alunos do IFPB. Metodologia: a atividade possuiu como objetivo capacitar a população-alvo sobre noções teóricas e práticas do Suporte Básico de Vida (SBV) em adultos e na pediatria, incluindo a participação de alunos do ensino médio e técnico, do Instituto Federal da Paraíba – Campus Patos. A atividade foi esquematizada e executada em duas etapas, num primeiro momento foram ministradas quatro aulas teóricas presenciais pelo professor parceiro do projeto. O conteúdo programático cumpriu o protocolo para SBV no adulto, SBV pediátrico, introdução ao desengasgo, OVACE e Manobra de Heimlich. Em seguida, foram realizados os treinamentos práticos, com os extensionistas e o professor parceiro, monitoradas pelos alunos. Realizou-se, anteriormente, uma capacitação com os discentes monitores. Para avaliação de impacto e do conhecimento dos participantes, foram aplicados pré e pós-testes e a realização de um teste prático na qual os alunos executavam as técnicas do SBV ministradas. Resultados: houve uma evolução de todos os participantes quanto ao desempenho cognitivo na realização do pós-teste em relação ao pré-teste. Conclusão: observa-se que foi possível efetivar a capacitação dos participantes na aplicação de uma técnica adequada e hábil. Dessa forma, o propósito do evento foi cumprido possibilitando a contribuição teórica e técnica dos discentes extensionistas da temática, além do desenvolvimento de competências presentes no currículo oculto através de conhecimentos.

Palavras-Chave: Emergência; SBV; Capacitação.

COMPLICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DE ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES NO MANEJO CLÍNICO DA DENGUE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ana Beatriz Vieira Sousa, Carolina Pedrosa Batista, Paula Karina Gomes da Silva Alves, Vitória Letícia Lima de Andrade, Rayanne Maia Cunha & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A dengue é uma arbovirose causada pelo vírus da família Flaviviridae e de rápida disseminação pelo vetor artrópode hematófago *Aedes Aegypti*. Os sintomas típicos da dengue incluem febre, mialgias, cefaléia, dor retro-orbitária, erupção cutânea e sintomas hemorrágicos leves. No manejo clínico da dengue, destacam-se a hidratação oral ou endovenosa, além do uso de analgésicos e antitérmicos. É importante ressaltar os riscos de sangramento com o uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINES) em pacientes com dengue. **Objetivo:** Identificar as possíveis complicações após a administração de anti-inflamatórios não esteroides no manejo clínico de pacientes com dengue. **Metodologia:** O estudo se trata de uma revisão integrativa em que foi realizada a busca nas bases de dados Publisher Medline e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores “Dengue” e “Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal”, os quais foram cruzados por meio do operador booleano “AND”. A partir dos critérios de elegibilidade foram pré-selecionados 73 artigos, e a amostra final se constituiu de 10 documentos nos idiomas inglês e português, e no período de publicação compreendido entre os anos de 2012 e 2022. **Resultados:** Dentre as complicações identificadas após o uso de AINES, pode-se destacar o risco de sangramento por meio do mecanismo de inibição da ciclooxigenase-1 (COX-1), o qual diminui a coagulabilidade. Esse risco de sangramento pode ocorrer em conjunto com a trombocitopenia na fase crítica da dengue. **Conclusões:** A administração de AINES na dengue é contraindicada, tendo em vista que as hemorragias graves são mais frequentes em pacientes com o histórico de uso de AINES.

Palavras-chave: Arbovirose; Riscos; Tratamento.



COMPLICAÇÕES DA INFECÇÃO DE HISTOPLASMOSE EM PACIENTES COM O VÍRUS DA AIDS NO BRASIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Vitória Letícia Lima de Andrade, Paula Karina Gomes da Silva Alves, Nayra
Delany de Amorim Alves, Eduarda Valadares Ribeiro Caetano & Everson
Wagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A histoplasmose é uma micose sistêmica adquirida por inalação de esporos do fungo *histoplasma spp*, presentes em excretas de aves, podendo atingir toda a população mundial. No estágio progressivo, foram observadas complicações pulmonares, cardíacas, meníngeas, hepáticas e em glândulas adrenais. Ademais, é nessa forma mais grave que os pacientes portadores do vírus da AIDS são mais acometidos, tendo maiores chances de morbimortalidade quando não tem o diagnóstico precoce e tratamento adequado da doença. **Objetivo:** Compreender as complicações acarretadas pela infecção da Histoplasmose em pacientes portadores de AIDS **Metodologia:** O estudo se trata de uma revisão integrativa em que foi realizada a busca nas bases de dados National Library of Medicine e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores “infection”, “histoplasmosis”, “patients”, “AIDS” e “Brazil”, os quais foram cruzados por meio do operador booleano “AND”. A partir dos critérios de elegibilidade foram pré-selecionados 141 artigos, e a amostra final constituiu-se de 24 documentos nos idiomas inglês e português, e no período de publicação compreendido entre os anos de 2019 e 2022. **Resultados:** Dentre as complicações identificadas na histomasmose, estão doenças cavitárias, hepatomegalia, esplenomegalia, alteração na medula óssea e choque séptico, as quais podem ser minimizadas com achados precoces em exames de cultura e de imagem e tratamento com associação de Anfotericina B e Fluconazol por 6 ou 12 meses **Conclusões:** A Histoplasmose na forma mais infecciosa ainda é pouco difundida em estudos, o que corrobora para em tratamento tardio e o aparecimento das complicações em pacientes aidéticos

Palavras-chave: Histoplasmose disseminada, Infecção fúngica, imunocomprometidos



CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM DE FISIOLOGIA ATRAVÉS DA MODALIDADE MONITORIA

Layssa Machado Alves, Pedro Gomes Vieira de Oliveira, Izabelly Ferreira de
Andrad & Geraldo Gonçalves de Almeida

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A monitoria consiste em uma modalidade de ensino paralela à ofertada pelas instituições de curso superior, onde os monitores auxiliam no processo ensino-aprendizagem dos alunos, objetivando facilitar a compreensão dos colegas acerca dos assuntos. Embora já existente, para potencialização da aprendizagem durante o período pandêmico, foram adotadas estratégias de abordagem teórica e prática com exposições interativas online, resolução de questões e dúvidas, com alunos de Medicina divididos em grupos. **Objetivo:** Analisando-se o perfil das dificuldades encontradas pelos egressos de Medicina, na disciplina de Fisiologia, e a influência das novas metodologias da monitoria. **Método:** Por meio da pesquisa exploratória e aplicação de entrevistas com os alunos do segundo período que cursavam esta disciplina em 2021.2, no Centro Universitário de Patos-PB, durante a pandemia por Covid-19. **Resultado:** Através das entrevistas, notou-se que após inserir as estratégias propostas pelos monitores entre 2021.2 e 2022.1, as notas dos alunos acima da média permaneceram constantes e o raciocínio clínico foi superior. Além disso, os alunos com maior dificuldade na disciplina, melhoraram a compreensão e o desempenho em condutas e avaliações. **Conclusões:** Verificou-se que a monitoria sanou estigmas sobre a impossibilidade de estudantes dotarem conhecimento necessário para cursarem os próximos períodos, uma vez que atuou como colaboradora de ensino e estimulou autoconfiança e dedicação de cada aluno, proporcionando-lhes resultados positivos.

Palavras-chave: Monitoria; aprendizagem; medicina.

EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DA ANFOTERICINA B EM PACIENTES COM HISTOPLASMOSE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Carolina Pedrosa Batista, Ana Beatriz Vieira Sousa, Raynne Maia Cunha,
Rayanne Maia Cunha, Francisco de Assis Remígio III & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A Histoplasmose é causada pelo *Histoplasma capsulatum*, um fungo dimórfico altamente endêmico em regiões orientais dos Estados Unidos e na América Latina. O principal fator de risco para a aquisição da doença é viajar para as áreas endêmicas do fungo. Os sintomas mais comuns relatados incluem tosse, dispnéia, mal-estar, febre e arrepios, podendo evoluir para episódios mais graves. O tratamento, em muitos casos, pode ser realizado com Anfotericina B ou suas formulações lipídicas. **Objetivo:** Identificar os possíveis efeitos que o paciente com Histoplasmose pode apresentar após a administração da Anfotericina B. **Metodologia:** O estudo se trata de uma revisão integrativa em que foi realizada a busca nas bases de dados Publisher Medline e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores "Histoplasmosis" e "Amphotericin B", os quais foram cruzados por meio do operador booleano "AND". A partir dos critérios de elegibilidade foram pré-selecionados 44 artigos, e a amostra final se constituiu de 14 documentos nos idiomas inglês e português, entre os anos de 2012 e 2022. **Resultados:** A Anfotericina B é indicada, especialmente, nos casos mais graves da micose sistêmica, sendo positiva, também, em acometimento da barreira hematoencefálica. As reações imediatas podem estar relacionadas à velocidade de infusão, causando febre, espasmos, calafrios, cefaleia e hipotensão, podendo ser amenizados quanto mais lenta for a administração. Ademais, a nefrotoxicidade é o maior problema dentre as reações tardias, podendo ser controlada com ajuste de dose. **Conclusões:** A Anfotericina B apresenta efeitos positivos consideráveis no tratamento da Histoplasmose e efeitos adversos passíveis de reversão.

Palavras-chave: Micose sistêmica; Tratamento; Reações adversas.



ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS PARA INFECÇÕES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTES À METICILINA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Vitória Letícia Lima de Andrade, Ana Beatriz Vieira Sousa, Carolina Pedrosa
Batista, Paula Karina Gomes da Silva Alves & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O surgimento de *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA), gerou um grande desafio nas intervenções médicas devido aos poucos medicamentos disponíveis para as doenças, que vão desde infecções na pele até pneumonias fatais. Nos últimos anos, com o uso excessivo de fármacos antibactericidas e a mutação genética das bactérias, o percentual de infecções de MRSA foi crescente, criando problemas para o tratamento eficaz e fazendo-se necessária a criação de estratégias terapêuticas no combate do problema. **Objetivo:** Analisar estratégias terapêuticas para pacientes infetados por MRSA. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa em que foi realizada a busca nas bases de dados, National Library of Medicine e Scientific Library Online, utilizando os Descritores Em Ciências da Saúde “therapeutic”, “strategies”, “methicillin-resistant”, “staphylococcus aureus” e “infections”, os quais foram cruzados por meio do operador booleano “AND”. A partir dos critérios de elegibilidade foram pré-selecionados 66 artigos, e a amostra final se constituiu de 28 artigos entre o período de 2020 à 2022 e utilizando os idiomas inglês e português. **Resultados:** Observou-se que o desenvolvimento de agentes nano-antibacterianos e fármacos potentes podem fornecer bons resultados contra bactérias que possuem resistências. **Conclusões:** A administração de medicamentos mais potentes e uma pesquisa sobre o perfil epidemiológico, conferem algumas alternativas para terapêutica de MRSA.

Palavras-chave: *Staphylococcus aureus* MRSA, antibiótico.



EXPOSIÇÃO INTRAUTERINA A DISTÚRBIOS HIPERTENSIVOS DA GESTAÇÃO: EFEITOS NO CRESCIMENTO PÓS-NATAL EM RECÉM- NASCIDOS PREMATUROS

Damiana Gerleide Brito Valério, Andreza Viana Monteiro, Aline Leite Barros,
Bianca Sousa Brito Almeida, Andreia Emily Silva de Azevedo & Yoshara da
Costa Anacleto Estrela

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Avaliar o crescimento pós-natal em recém-nascidos prematuros expostos a distúrbios hipertensivos da gestação. **Métodos:** Trata-se de uma revisão integrativa, na qual as bases de dados do SCIELO e PUBMED foram consultadas para levantamento de artigos publicados entre 2018 e 2022. Foram utilizados como descritores “Distúrbios hipertensivos”, “Gestação” e “Crescimento de Prematuros”, sendo empregados como critérios de inclusão: artigos em português e inglês, dispostos na íntegra. A amostra foi composta por 10 artigos mais pertinentes sobre o tema. **Resultados:** A hipertensão gestacional acomete cerca de 7% das gestantes brasileiras e consiste no aumento da pressão arterial que acontece após a vigésima semana de gestação, podendo causar danos a saúde do bebê. Nota-se que os recém-nascidos (RN) filhos de mães com síndrome hipertensiva durante a gestação apresentam uma maior necessidade de internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, maior risco de sobrepeso, principalmente aos 24 meses de vida, e maior risco de crescimento inadequado, quando comparados a filhos de mães não hipertensas. **Conclusão:** Diante disso, constatou-se que os distúrbios hipertensivos na gestação estão relacionados ao maior risco de morte fetal, prematuridade e restrição de crescimento. Com isso, evidencia-se a necessidade de um pré-natal de qualidade e cuidados especializados ao recém-nascido.

Palavras-chave: distúrbios hipertensivos; gestação; crescimento; prematuros.



IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS SÍNDROMES GENÉTICAS NA CIDADE DE PATOS-PB

Ana Beatriz Vieira Sousa, Carolina Pedrosa Batista, Kandyce Medeiros
Lacerda, Layssa Machado Alves, Kalliane Kelly De Almeida Querioz Falcao &
Giselle Medeiros Da Costa One

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: As síndromes e doenças genéticas estão associadas a mutações e podem se manifestar ao nascimento ou ao longo da vida. Algumas alterações genéticas são incompatíveis com a vida, enquanto outras induzem a manifestação clínicas, como malformações e déficits cognitivos. **Objetivo:** Identificar as principais síndromes genéticas notificadas no município de Patos-PB. **Método:** A pesquisa foi realizada na APAE (Patos-PB) e na Clínica de Fisioterapia da UNIFIP, Patos PB no período de outubro de 2021 a março de 2022. Na Clínica, foram estudados os prontuários dos pacientes atendidos na Pediatria durante o período de 2017 a 2021. **Resultados:** Devido a pandemia, os atendimentos da APAE estavam suspensos, não sendo possível realizar nenhuma atividade local, os atendimentos retornaram no início de março, não sendo viável acesso aos pacientes com síndromes. Na Clínica de Fisioterapia, verificou-se a prevalência de crianças portando síndromes de Down, West, Edwards, Rett e TEA, talvez apenas esses casos foram atendidos devido a possível subnotificação de síndromes genéticas na cidade de Patos, foi proposto avaliar tais casos. Os casos de Down foram registrados em maior incidência, e estas crianças também apresentavam Hipotonia e atraso no DNPM. Apenas 1 criança do sexo feminino foi diagnosticada com Down do tipo mosaicismo e portava Síndrome de West. **Conclusão:** Notificada, a síndrome que apresenta maior prevalência foi a de Down. Esse projeto propõe a busca prospectiva e notificação de casos de doenças genéticas na cidade de Patos/PB, a fim de contribuir com a saúde pública e com futuros estudos.

Palavras-chave: Síndromes genéticas. Aconselhamento genético. Down.



FATORES DE MULTIRRESISTÊNCIA EM CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM AMBIENTES HOSPITALARES

Kandyce Medeiros Lacerda, Sarah Melo Alencar & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Abordar os principais fatores que colaboram para resistência de *Staphylococcus aureus*, além de sua recorrência em ambientes hospitalares. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, na qual as bases de dados do Scielo e PubMed foram consultadas para levantamento de artigos publicados em periódicos indexados open access, compreendidos no período de 2018 a 2022. Na estratégia de busca, foram utilizados os descritores: " Bactérias AND uti AND covid". Entre 98 artigos encontrados, 38 constituíram a amostra, utilizando-se como critérios de inclusão: artigos em português e inglês, dispostos na íntegra. **Resultados:** Infecções hospitalares relacionadas a *Staphylococcus aureus* meticilino resistente (MRSA) caracterizam risco elevado aos pacientes, verificando-se quadros de septicemia de manejo delicado. O uso indiscriminado ou abusivo de antibióticos apresenta-se como principal fator à resistência de *S. aureus*, visto que essas bactérias criam mecanismos de escape aos medicamentos através da diminuição da afinidade às proteínas ligadoras de penicilina e à diminuição das porinas que permitem a permeabilidade da membrana. Além disso, o uso inadequado de medicações que não alcançam a MIC (Concentração Inibitória Mínima) para inibir o crescimento bacteriano alteram a estrutura e velocidade de proliferação da bactéria. **Conclusão:** *Staphylococcus aureus* meticilino resistente (MRSA) é recorrente em ambientes hospitalares, constituindo um problema de saúde pública devido ao perfil de difícil eliminação e alta infectividade. O emprego de antibióticos direcionados, com a concentração adequada, é essencial ao tratamento eficaz das infecções por esta bactéria, minimizando os quadros de resistência e, conseqüentemente, prognósticos desfavoráveis aos pacientes.

Palavras-chave: Cepas multirresistentes; Infecção hospitalar; Antibioticoterapia.



A IMPORTÂNCIA DAS MONITORIAS PARA OS MONITORADOS E MONITORES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Samya de Figueiredo Ferreira Ramos, Lara Maria Ferreira Lopes Valério Pinto,
Antonio Campos de Sousa Filho, Ana Beatriz Vieira Sousa & Fabrício Kleber de
Lucena Carvalho

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Relatar a importância da implantação monitorias de disciplinas práticas, com foco na disciplina de histologia do curso de medicina da UNIFIP. Método: São realizados encontros semanais nos laboratórios de histologia com os professores, monitores e estudantes “monitorados”. Para potencializar o aprendizado das práticas de histologia, as monitorias são realizadas em grupos de no máximo 15 estudantes, por meio de exposições interativas e treinamentos práticos laboratoriais, havendo o acompanhamento prático, e a apresentação de imagens das lâminas e suas principais características. Resultado: Nota-se, resultados positivos quanto a esse acompanhamento extracurricular na disciplina de histologia, ficando claro o melhoramento do desempenho acadêmico, da formação ética e profissional dos discentes na matéria supracitada. Em relação aos monitores, além das horas extracurriculares, pode-se observar uma maior dedicação em relação ao curso, pois os mesmos acabam possuindo uma maior aproximação com os professores das disciplinas, e conseqüentemente aprendem a lidar com grupos maiores de estudantes trazendo assim a experiência da docência e de planejamento pedagógico, fazendo esse contato precoce e amadurecendo uma possibilidade da carreira docente. Conclusão: Dessa forma, a monitoria consiste em uma ação de desenvolvimento humano-acadêmico fundamental para a formação dos estudantes, visto que há uma troca de conhecimentos, e tanto o monitor quanto os acadêmicos participam do processo de ensino e aprendizagem. Além disso, a decisão de se tornar monitor vai muito além de um possível retorno lucrativo, pois é uma escolha por amor, onde o desejo é dar sempre o melhor para os colegas que estão com dificuldades e trabalhando, assim, o autoconhecimento.

Palavras-chaves: Desempenho acadêmico ; Histologia ; Aprendizagem.



INCIDÊNCIA DA DEPRESSÃO EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA

Thaís Helena Gomes de Sousa, Nicole Joane Pereira e Silva, Germana
Fernandes Constantino, Ana Luiza Silva de Araújo Lucena e Sousa & Everson
Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: A fibromialgia é uma doença crônica caracterizada por dores musculoesqueléticas generalizadas, cuja prevalência é maior em mulheres, e com etiopatogenia idiopática e multifatorial. Suas manifestações clínicas vão desde dor muscular tardia, fadiga, distúrbios do sono, rigidez matinal, dispneia, falta de concentração, esquecimento, constipação, cefaleia até alterações de humor. Tais condições afetam negativamente a qualidade de vida do paciente e podem gerar consequências psicológicas, como ansiedade e depressão. **OBJETIVO:** Analisar e compreender as correlações clínicas entre fibromialgia e depressão. **MÉTODO:** Pesquisa bibliográfica de artigos nas principais revistas sobre o tema nos bancos de dados Scielo, BVS, PUBMED e Google Acadêmico entre os períodos de 2012 a 2022, havendo seleção de 4 artigos após aplicação do critério que foi estar relacionado ao tema específico. **RESULTADOS:** Os resultados obtidos nas pesquisas com pacientes portadores de fibromialgia mostraram alta incidência do transtorno depressivo, variando de 50,5% a 80%. Além disso, os estudos revelaram que a progressão da doença pode levar o paciente a apresentar uma exacerbação das dores físicas e mentais, contribuindo para o surgimento de irritabilidade e isolamento social. Dessa forma, há o prejuízo das estratégias de enfrentamento do paciente, implicando em sintomas depressivos e com eles o aumento da percepção da dor, diminuição da adesão ao tratamento e do apoio social. **CONCLUSÃO:** Esses resultados enfatizam que a depressão é um acometimento muito prevalente entre os pacientes com fibromialgia e afeta negativamente o prognóstico desses indivíduos. Diante disso, faz-se necessário que seja dada uma maior notoriedade à condição psicológica de pessoas com fibromialgia, com a finalidade de promover uma melhor qualidade de vida aos portadores dessa condição crônica.

Palavras-Chave: Fibromialgia; Depressão; Qualidade de vida

BAHE – Brazilian Archives of Health and Environment, v. 3, n. esp. 1 (2022).
ISSN:2675 - 2298

02 A 04 DE JUNHO

2022

<https://bahe.unifip.edu.br>

MAPEAMENTO DAS CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO TERRITORIAIS PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E RISCO DE OBESIDADE COM USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS

Miriam de Andrade Brandão, Janaina Lucio Dantas, Eulâmpio Dantas
Segundo, José Rebberty Rodrigo Holanda, Maria Fernanda Fontes de Paula
Castanho & Regina Keiko Sato Mizuno Filha

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

RESUMO

A insegurança alimentar, mesmo sendo de curto prazo, como na pandemia da COVID-19, pode gerar impactos significativos na saúde das crianças, como piores resultados comportamentais, emocionais e nutricionais. E, a insegurança alimentar tem sido associada ao aumento de risco de obesidade (KINSEY, 2020). No Brasil, a POF 2017-2018 indica que metade (49,5%) das calorias totais disponíveis para consumo nos domicílios brasileiros provém de alimentos in natura ou minimamente processados, 22,3% de ingredientes culinários processados, 9,8% de alimentos processados e 18,4% de alimentos ultraprocessados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2014), a obesidade é uma doença crônica e considerada uma pandemia que afeta tanto crianças quanto adultos, tornando-se uma preocupação de saúde pública. Insere-se como fator de risco importante para o desenvolvimento de outras doenças crônicas e não transmissíveis (DNTs) e revela desequilíbrio colossal entre as esferas sociais, econômicas e culturais. Este estudo propõe-se à estruturação de um mapeamento na assistência territorial das condições de alimentação e nutrição em um distrito de saúde, elaborado a partir de pesquisa-ação com profissionais de saúde e usuários, por meio de tecnologias digitais, com objetivo de qualificar as análises e tomadas de decisão da gestão pública e o empoderamento das organizações populares para a redução da Insegurança Alimentar e Nutricional. O estudo preliminar será realizado na área de abrangência de uma unidade básica de saúde em Caicó-RN que recebe alunos dos cursos da EMCM e Residências Multiprofissionais em Atenção Básica.

Palavras-chave: Insegurança Alimentar e Nutricional; Obesidade; Tecnologia Digital; Atenção Primária à Saúde.

OS IMPACTOS DO HIV NA QUALIDADE DE VIDA DOS INDIVÍDUOS INFECTADOS DE FORMA TRANSVERSAL

Monalisa Maria de Souza Fernandes Paulo, Luiz Henrique Celestino Camboim
Sousa, Giovanna Kailany Machado de Oliveira Moura, Francisco de Assis
Remigio III, Antonio Reney Beserra de Araujo & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O HIV é uma patologia incurável, imunodepressora, cuja principal forma de transmissão provém da relação sexual. Porém, existem outras formas de difusão do vírus, como a transversal, que afeta, no Brasil, cerca de 0,42% dos neonatos, mesmo havendo tratamento preventivo eficaz. Nascer HIV positivo reflete fatores predisponentes à diminuta qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS), quando comparado com controles saudáveis pareados por idade, sexo e status socioeconômico. **Objetivo:** Abordar impactos gerados pelo HIV positivo na QVRS durante o decorrer da vida dos infectados pela transmissão vertical. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática composta de 52 artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando como descritores: “Crianças”, “HIV” e “Qualidade de vida”. Empregou-se como critérios de inclusão: texto completo, publicados entre 2017 e 2022, assuntos principais relacionados a “Estigma social”, “Infecções por HIV” e “Qualidade de vida”. **Discussão:** Há uma estrita relação entre o HIV e a má QVRS, tanto no tocante ao desenvolvimento mental quanto aos estigmas que serão enfrentados durante a vida. Evidenciou-se que crianças infectadas possuem déficit nos domínios executivo e cognitivo, o que se deve à neuroinflamação ininterrupta, à disfunção vascular e à hipercoagulabilidade induzidas pelo vírus, ocasionando dificuldades no aprendizado. Além disso, durante o desenvolvimento, outros percalços podem influenciar na QVRS, como sexualidade e adesão à medicação. **Conclusão:** A QVRS em neonatos infectados compromete os domínios cognitivo e executivo e favorece um cenário psicossocial defectivo, fazendo com que eles sofram ainda mais com os estigmas sociais.

Palavras-Chave: Crianças; HIV; Qualidade de vida.

OS POSSÍVEIS RISCOS DA ADMINISTRAÇÃO DO ALBENDAZOL NO TRATAMENTO DA CISTICERCOSE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Carolina Pedrosa Batista, Ana Beatriz Vieira Sousa, Vitória Letícia Lima de
Andrade, Paula Karina Gomes da Silva Alves, Raynne Maia Cunha & Hirisleide
Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A Cisticercose é causada pela ingestão de ovos da *Taenia solium*, presentes em alimentos ou água contaminados. Os ovos se transformam em larvas e migram para os diferentes tecidos do hospedeiro, o qual pode apresentar sintomas variados, como convulsões, meningite, miocardites, problemas oftálmicos, dentre outros. O tratamento possui o Albendazol como primeira escolha, todavia, tal medicamento pode causar potenciais riscos durante sua administração. **Objetivo:** Identificar os efeitos negativos que o paciente com Cisticercose pode apresentar durante a administração do Albendazol. **Metodologia:** O estudo se trata de uma revisão integrativa em que foi realizada a busca nas bases de dados Publisher Medline e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores “Cysticercosis”, “Albendazole”, e “Side Effects”, os quais foram cruzados por meio do operador booleano “AND”. A partir dos critérios de elegibilidade foram pré-selecionados 20 artigos, e a amostra final se constituiu de 12 documentos nos idiomas inglês e português, entre os anos de 2012 e 2022. **Resultados:** O Albendazol proporciona bons índices de cura. Entretanto, apresenta riscos significativos, pois, por apresentar boa penetração na barreira hematoencefálica, logo nos primeiros dias de uso, podem ocorrer convulsões simultâneas à morte dos parasitas. Além disso, é comum o paciente manifestar fadiga, diarreia, cefaleia, xerostomia e dor abdominal, que se configuram como reações de risco mínimo, as quais podem ser reduzidas com associação de sintomáticos. **Conclusões:** Apesar das vantagens do uso do Albendazol no combate à Cisticercose, os efeitos colaterais evidenciados são consideráveis, sendo necessário, portanto, o acompanhamento cauteloso do indivíduo durante o tratamento.

Palavras-chave: Parasitose; Anti-helmíntico; Reações adversas.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CENÁRIO DA ONCOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

João Eduardo Miranda Lima, Maria Alice Ferreira Farias, Victor César Urquiza
Candeia & Fabrício Kléber de Lucena Carvalho

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivos: Trazer aos pacientes oncológicos e à população em geral, alguns conhecimentos a cerca da medicina alternativa e sua importância na garantia de um cuidado integrado. Método: Os extensionistas realizaram atividades de panfletagem e distribuição de frascos contendo óleo de girassol com essência de tomilho para os pacientes oncológicos do Hospital do Bem e para a população em geral da cidade de Patos-PB, além de realizarem breves demonstrações e palestras sobre medicina alternativa e seu funcionamento na prática. Resultados: Executar a medicina alternativa na prática possibilitou aos extensionistas uma visão mais abrangente no ato do cuidado. Haja vista que os pacientes em geral, e especialmente os oncológicos, estão constantemente em contato com a medicina farmacológica, que em certos momentos pode até contribuir com o adoecimento. Conclusão: Conclui-se que a visita trouxe como pontos positivos um melhor conhecimento sobre outras formas de cuidado, tanto para a população em geral, quanto para os próprios extensionistas. Dentre os negativos, encontra-se a impossibilidade de acompanhamento dos pacientes oncológicos, durante o período de uso das essência e observar se houve melhora.

Palavras-chave: “Terapias complementares”; câncer; tratamento.

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À OBESIDADE INFANTIL: REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

Miriam de Andrade Brandão, Janaína Lúcio Dantas, Eulâmpio Dantas
Segundo, José Rebberty Rodrigo Holanda, Maria Fernanda Fontes de Paula
Castanho & Regina Keiko Sato Mizuno Filha

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

RESUMO

Introdução: A obesidade infantil é um problema de saúde pública que tem adquirido proporções crescentes no Brasil e no mundo elevando as taxas de morbimortalidade em crianças pré-escolares, principalmente na faixa etária de 2 a 5 anos. Diante desse contexto, surge a necessidade de identificação de fatores de risco que possam estar associados com o evento, assim como a identificação da prevalência média de casos já existentes de uma forma abrangente. **Objetivo:** O objetivo do estudo foi identificar a prevalência e fatores associados à obesidade infantil. **Método:** Trata-se de uma revisão sistemática com meta-análise. Foram pesquisados nas fontes Web of Science, PubMed, Scopus e EMBASE. Foi realizada análise de viés e estatística com uso do software R 4.0. **Resultados:** Inicialmente foram encontrados 5089 estudos dos quais a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 14 foram selecionados. Com a análise conjunta dos estudos, foi possível verificar uma prevalência de 5% para obesidade significativa, com intervalo de confiança entre 4% e 7%. Os resultados indicam um risco de 2,06 vezes maior para crianças com presença dos fatores de risco em relação às que não possuem esses fatores. **Conclusão:** Vários fatores de risco estão positivamente associados com o desenvolvimento de obesidade infantil o que incita a uma necessidade considerável de implementação de estratégias preventivas.

Palavras-chave: Obesidade infantil; Fatores de risco; Prevalência.

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MAMANGUAPE (PB): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Miriam de Andrade Brandão, Eulâmpio Dantas Segundo, Janaína Lúcio
Dantas, Maria Fernanda Fontes de Paula Castanho, Regina Keiko Sato Mizuno
Filha & Audrey Vinnícios Antunes Tavares

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Política e o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) têm por objetivo garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. **OBJETIVO:** Este trabalho tem como objetivo relatar um projeto de extensão realizado pela Secretaria de Saúde de Mamanguape-PB que teve por finalidade fortalecer as práticas de responsabilização e autocuidado nas unidades básicas de saúde, centros de atenção psicossocial e espaços públicos através da Farmácia VIVA, cultivo de plantas medicinais e beneficiamentos para fitoterápicos. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência sobre a implantação da fitoterapia e plantas medicinais na assistência farmacêutica. **RESULTADOS:** O projeto foi elaborado em cinco fases: fase 1: cultivo, produção e dispensação (escolha dos estabelecimentos de saúde), fase 2: produção da matéria-prima (babosa, hortelã, plantago, alecrim, boldo, erva-doce, girassol, hortelã da folha miúda, alho, capim-santo, erva-cidreira, mastruz), fase 3: oficina de criação das Farmácias VIVAS (oficina de pintura, marcenaria, Assistência Farmacêutica e Fitoterápica), fase 4 (formação técnico-científica e capacitação no setor de plantas medicinais e fitoterápicos). **CONCLUSÃO:** A ampliação das opções terapêuticas ofertadas aos usuários do Sistema Único de Saúde, com acesso a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da integralidade da atenção à saúde, é uma importante estratégia com vistas à melhoria da atenção à saúde da população e à inclusão social.

Palavras-chave: assistência farmacêutica, fitoterapia, plantas medicinais.



RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO INFANTIL E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

Lisandra Samara Verdegér Faustino, Maria Alexandra Pereira Souza &
Umberto Marinho de Lima Júnior

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O sono exerce uma enorme influência sobre a vida cotidiana, especialmente no desenvolvimento físico e psicológico das crianças, que imprimem diretamente o processo de aprendizagem. Dormir é um período de descanso, mas também de funcionamento do cérebro, sendo durante as fases do sono que ocorrem processos fisiológicos e comportamentais responsáveis por regular diversas atividades no corpo humano. **Objetivo:** Compreender a relação entre a qualidade do sono infantil e o desenvolvimento cognitivo. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, que usou os seguintes Descritores em Ciências e Saúde (DeCS): cognição, pediatria e sono, os quais foram combinados pelo operador booleano “AND”. Selecionou-se artigos publicados entre 2018 e 2022, que respondiam à questão norteadora. **Resultados:** Alguns fatores exercem influência sob a qualidade do sono infantil, quais sejam: exposição a tecnologia, alimentação inadequada e falta de exercícios físicos. Como consequência, a baixa qualidade do sono acarreta diminuição no rendimento escolar e no desenvolvimento cognitivo infantil, já que é um fator fisiológico na vida humana e essencial durante a infância. **Conclusão:** Infere-se que um sono de qualidade traz resultados benéficos para o desenvolvimento cognitivo infantil, de modo que um sono sem qualidade contribui de maneira negativa para esse processo, a curto e a longo prazo.

Palavras-chave: Cognição. Pediatria. Sono.



RELATÓRIO SOBRE O ASPECTO DA MONITORIA DE HISTOLOGIA APLICADA NAS MINI OSCES

Ana Luiza Silva de Araújo Lucena e Sousa, Wândyna Braga de Oliveira, Maria
Alice Ferreira Farias, Jéssica Benevides Santos & Fabrício Kleber de Lucena
Carvalho

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Descrever a uma das metodologias (miniOSCE) aplicadas durante os encontros de monitoria do primeiro, segundo e terceiro período de medicina da UNIFIP. Métodos: Dentre os encontros de monitoria, após abordagem geral dos conteúdos de aprendizagem, são realizadas simulações da prova prática (miniOSCE). Os monitores preparam o aluno durante toda a unidade com a disponibilização de materiais, aulas de revisão e direcionamento do conteúdo prático. No final de cada unidade a miniOSCE é realizada através de lâminas e microscópios, no máximo com grupos de 15 alunos, e é aplicada no tempo de 3 minutos em cada microscópio. Resultados: Com a aplicação da miniOSCE, pode-se observar uma melhor preparação dos alunos quanto à aprendizagem como também uma melhor noção de como será realizada a prova prática de Histologia no final da unidade de aprendizagem. Após a metodologia os discentes se sentem mais seguros e familiarizados com as lâminas disponibilizadas pela faculdade, que em parte, serão utilizadas na avaliação de seus conhecimentos aplicada pelo corpo docente. Ademais, para os monitores da matéria, é de suma importância, pois contribui para revisar e relembrar o conteúdo já visto em um período anterior ao que está cursando. Conclusão: A monitoria de Histologia e como também as metodologias aplicadas na disciplina se mostram de fundamental importância para o aprendizado acadêmico em histologia, à medida que tal método de simulação, além de consolidar conhecimentos, torna o indivíduo mais confiante em suas capacidades antes da realização de exames, devendo, assim, ser adotado de maneira frequente por monitores de histologia e ter sua ampla participação incentivada entre os discentes.

Palavras-Chave: Autoteste; Habilidades para Realização de Testes, Aprendizagem; Histologia.

DISBIOSE INTESTINAL COMO UM FATOR CONTRIBUINTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE SEPSE EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS

Carlana Ingrid de Castro Silva, Maria Júlia Maia Guilherme & Umberto Marinho
de Lima Júnior

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

INTRODUÇÃO: A disbiose é caracterizada pelo desequilíbrio da microbiota gastrointestinal que, em recém nascidos pré-termo (RNPT), pode ocorrer devido a várias situações estressoras as quais eles são submetidos, podendo acarretar inúmeros desfechos negativos, dentre eles a sepse. **OBJETIVO:** Compreender a influência da disbiose na ocorrência de sepse em RNPT. **MÉTODO:** Revisão integrativa, utilizando Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) “disbiose”, “sepse” e “recém-nascido prematuro” para pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e no Medical Publisher (PUBMED). Selecionou-se publicações dos últimos três anos e que tinham melhor relação com o tema, totalizando uma amostra de oito artigos. **RESULTADOS:** A exposição precoce a agentes do trato gastrointestinal (TGI) devido à ruptura prematura das membranas e a frequente necessidade de utilização de dispositivos invasivos nesses recém-nascidos geralmente implicam no uso de antibióticos de largo espectro, os quais prejudicam o desenvolvimento de uma microbiota normal. Ademais, a introdução tardia de alimentos enterais e a retenção prolongada também contribuem para o aparecimento da disbiose. A relação entre disbiose e sepse se deu pela redução de bactérias protetoras contra a sepse e também pela disseminação de microrganismos resistentes, pelo uso de antibióticos de ampla ação. **CONCLUSÃO:** Portanto, a exposição precoce a espécies do TGI, o uso de antibióticos e as dificuldades na alimentação enteral contribuem para a gênese da disbiose em RNPT, o que contribui para o aparecimento de sepse. Novos estudos são necessários para que haja uma melhor sistematização de novas terapias, de modo a torná-las mais eficazes e seguras.

Palavras-Chave: Disbiose; Prematuridade; Recém-Nascido.

A CONTRIBUIÇÃO DA MONITORIA ACADÊMICA PARA O PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM DA CITOGENÉTICA

Giovanna Kailany Machado de Oliveira Moura, Jeffersson Gomes de Araújo &
Giselle Medeiros da Costa One

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: Observando as dificuldades em citogenética relatadas pelos alunos, é de suma importância a existência de meios para que estas sejam sanadas, sendo esse o principal intuito da monitoria. Outro propósito relevante é o aperfeiçoamento do ensino e aprendizagem, através de uma estimulação da participação ativa dos estudantes, contribuindo para a consolidação dos conhecimentos adquiridos por estes. **Objetivo:** O presente estudo tem como finalidade apresentar a contribuição da monitoria nos processos de ensino e aprendizagem de citogenética, auxiliando na construção do conhecimento básico/fundamental para essa disciplina. **Métodos:** A monitoria ocorre através das seguintes etapas: coleta de informações sobre as dúvidas dos alunos e remediação destas através de plantões tira-dúvidas e mini aulas, semanalmente. Os conteúdos abordados também são revisados quinzenalmente através de listas de exercícios e simulados, além de atividades gamificadas antes das avaliações. Todas essas atividades são direcionadas pela professora orientadora, através de encontros semanais com os monitores. **Resultados:** Os métodos abordados vêm sendo boas estratégias de apoio ao ensino, bem como momentos de enriquecimento da vida acadêmica do educando, tendo em vista a dinâmica acadêmica abordada. Isso se justificada por meio dos resultados promissores dos alunos na matéria em questão, que podem ser observados tanto na melhoria dos resultados das avaliações, como no crescente interesse destes pela citogenética. **Conclusão:** A monitoria da disciplina citogenética contribui positivamente para o aprendizado dos discentes, sendo de grande importância que essa se perdure, a fim de obter resultados ainda melhores em relação a evolução acadêmica dos estudantes de medicina.

Palavras-Chave: Monitoria; Genética; Aprendizagem.



O IMPACTO DO ENSINO BASEADO EM SIMULAÇÃO CIRÚRGICA NA FORMAÇÃO MÉDICA

Shawana Meita Souza Gomes, Gabriel Aleixo dos Santos Cordeiro Carvalho,
Vitor Brenno Bezerra da Silva, Suzana Régis Araújo & Wostenildo Crispim
Ramalho

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O estudo relata a experiência de uma equipe de monitores que passaram por um processo seletivo voluntário e posteriormente, por uma capacitação, que teve o intuito de aprimorar expertises no campo da clínica cirúrgica, dentro do processo pedagógico que engloba treinamento de habilidades através das simulações e aulas com suporte teórico-prático. **Objetivo:** Relatar a experiência desta equipe e o impacto desse trabalho na formação médica. **Relato:** A equipe é formada por 4 monitores, que são estudantes do 7º período de medicina da UNIFIP, os quais já passaram pela disciplina de base em técnicas cirúrgicas. A dinâmica das monitorias foi desenvolvida no Ensino Baseado em Simulação (EBS) com vigência de exaltar as potencialidades deste método, que é bem visto dentro da docência na área da saúde. É então oferecido um momento de exposição teórica, com intuito de embasar o momento prático, que vem conseguinte e é composto pela realização de procedimentos como sutura e acesso venoso central. É ainda ofertado um módulo que aborda assepsia, antisepsia, noções de centro cirúrgico e instrumentação cirúrgica, com a finalidade de aprimorar os aspectos cognitivos através das ferramentas tecnológicas que a instituição fornece. **Reflexão:** É visível, portanto, que a estratégia pedagógica utilizando o EBS como ferramenta foi capaz de impactar positivamente o processo de formação médica dos estudantes. **Considerações finais:** A experiência exposta trouxe para a equipe formada a oportunidade de desenvolver habilidades no campo de trabalho em equipe, liderança, docência, oratória e técnica cirúrgicas.

Palavras-Chave: Ensino Baseado em Simulação; Clínica Cirúrgica; Monitoria.

A NECESSIDADE DAS CONSULTAS DE PUERICULTURA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SERTÃO PARAIBANO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Aline Tavares de Oliveira & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A puericultura consiste na promoção e proteção à saúde das crianças, através de consultas periódicas, iniciadas logo após o nascimento até os dois anos de idade, que são realizadas pelo médico e enfermeiro. **Objetivo:** Averiguar se a puericultura está sendo realizada segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, em uma unidade básica de saúde do sertão paraibano. **Método:** O estudo foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde, no município de Pombal, estado da Paraíba utilizando a metodologia do Arco de Maguerez, que consiste nas seguintes etapas: 1) observação da realidade, 2) pontos-chave, 3) teorização, 4) hipótese de solução e 5) aplicação à realidade. **Resultados:** Implementação das consultas de rotina com médica e enfermeira, alternadamente, durante um turno específico para essa população toda semana: o período da manhã na quinta-feira, facilitando o acesso e o cuidado continuado. Para as crianças a partir dos seis meses de idade, a utilização da consulta compartilhada com a nutricionista para auxiliar na fase de introdução alimentar e em casos que seja notado atraso na linguagem, o apoio da fonoaudióloga. **Conclusão:** Assim, apesar dos desafios impostos pela pandemia do Covid-19, como o isolamento social e o uso obrigatório de máscaras, aliado ao efetivo trabalho de toda a equipe da unidade básica de saúde, conseguimos efetivar as consultas periódicas com consequente observação da melhora significativa do padrão alimentar, atualização da caderneta de vacinação e encaminhamento para especialistas em tempo hábil, para casos específicos.

Palavras chave: Atenção Primária à Saúde. Cuidado da Criança. Saúde do Lactente.

A FUNÇÃO DA ZONULINA NA PERMEABILIDADE INTESTINAL

Luís Eduardo Carreiro Dóia, Pedro Gomes Vieira de Oliveira, Felipe de Andrade
Moreira, Maria de Fátima Trigueiro Silva, Ana Beatriz da Nóbrega Marinho &
Umberto Marinho de Lima Júnior

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A permeabilidade do intestino é garantida por enterócitos, que são células no TGI, e por junções comunicantes, dentre elas a zonulina, que é uma proteína moduladora da penetrabilidade no espaço intercelular. No entanto, alguns fatores externos podem interferir na modulação dessa permeabilidade, levando pessoas a adquirirem alguns problemas e doenças ao longo de sua vida. **Objetivo:** Analisar a influência da zonulina na permeabilidade intestinal. **Método:** Pesquisa qualitativa e descritiva, tendo como fontes a revisão da literatura realizada nas bases de dados: Medical Publishing (PUBMED), Scielo e Google Acadêmico empregando os Descritores em Ciência da Saúde em inglês “Zonulin” e “Permeable Intestine” utilizando o operador booleano AND. Foram incluídos artigos publicados em inglês, entre os anos de 2020 e 2022 e postergados estudos e revisões. **Resultados:** Percebe-se, de acordo com os estudos analisados, que a zonulina é o único modulador fisiológico que regula as funções intercelulares do intestino. Consequentemente há uma necessidade de níveis corretos dessa proteína, através da boa alimentação e o não consumo de álcool para a homeostase, já que alguns fatores como estresse e glúten podem alterar esta via causando uma desregulação na penetrabilidade intestinal, levando a doenças inflamatórias crônicas e doenças autoimunes. **Conclusão:** Conclui-se que há necessidade de manter hábitos saudáveis, para que haja uma regulação eficaz dos níveis de zonulina e consequentemente da manutenção da penetrabilidade intercelular entérica.

Palavras-chave: Doenças; Permeabilidade intestinal; Zonulina.



A IMPORTÂNCIA DA CONSULTA PEDIÁTRICA NO PRÉ-NATAL

Ana Beatriz da Nóbrega Marinho, Felipe de Andrade Moreira, Luís Eduardo
Carreiro Dóia, Maria de Fátima Trigueiro Silva, Pedro Gomes Vieira de Oliveira
& Umberto Marinho de Lima Júnior

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: O acompanhamento pediátrico pré-natal é pouco realizado na rotina ambulatorial. Dentro desse contexto, é imprescindível a participação rotineira do médico pediatra especialmente durante o terceiro trimestre da gestação, que atrelado à assistência ao recém-nascido e o puerpério contribuem para redução da morbimortalidade infantil. Além disso, essa prática auxilia na construção de um vínculo médico-família. **Objetivo:** Analisar a relevância da avaliação pediátrica no período pré-natal como forma de minimizar riscos para o recém-nascido. **Método:** Pesquisa qualitativa e descritiva, tendo como fontes a revisão da literatura realizada nas bases de dados: Medical Publishing (PUBMED) e Google Acadêmico, empregando os Descritores em Ciência da Saúde em inglês "Prenatal" e "Pediatrician" utilizando o operador booleano AND. Foram abarcados artigos publicados em inglês e português, entre os anos de 2014 e 2022 e postergados estudos e revisões. **Resultados:** Nota-se que, de acordo com Yogman et al. (2018), 78% dos pediatras ofertam consultas pré-natais aos pacientes, no entanto apenas de 5 a 39% dos pais de primeira viagem buscam este atendimento. Ademais, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), mostrou que a adesão a esta prática ajuda na prevenção de doenças infecciosas no RN, na programação para assistência pediátrica em sala de parto, orientações sobre o aleitamento materno. **Conclusão:** Conclui-se, de acordo com os estudos em questão, que a consulta pré-natal realizada pelo pediatra no trimestre final da gravidez é de suma importância para prevenção de saúde da criança, além da criação de uma relação médico-família desde o princípio gestacional.

Palavras-chave: Gestação. Pediatria. Pré-natal.

A IMPORTÂNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA MANOBRA DE HEIMLICH NA PREVENÇÃO DE ÓBITOS EM CASOS DE ENGASGO EM CRIANÇAS

Giovanna Kailany Machado de Oliveira Moura, Ohara Nayanne Nunes Pereira
Inácio de Queiroz & Umberto Marinho de Lima Júnior

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE), também conhecida como engasgo, consiste na oclusão total ou parcial da passagem de ar nas vias aéreas por objetos sólidos. Pesquisas mostram que o melhor método de desobstrução, nesses casos, é a Manobra de Heimlich, que consiste na compressão do diafragma da pessoa engasgada e que faz com que o objeto seja expelido. **Objetivos:** Este estudo objetiva mostrar que é de suma importância a disseminação da Manobra de Heimlich para a população leiga, a fim de prevenir óbitos em crianças com OVACE. **Metodologia:** Foi feita uma Revisão Sistemática da Literatura a partir de dados de artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), publicados entre 2016 e 2021. No qual após aplicação de critérios, como texto completo e relação com o tema específico, obteve-se uma amostra final de 4 artigos. **Resultados:** Foi evidenciado que, no Brasil, o engasgo leva ao óbito cerca de duas mil crianças por ano, entretanto, a disseminação do conhecimento acerca da Manobra de Heimlich por pessoas leigas diminui esse número, pois previne as complicações e possíveis sequelas às crianças vítimas de OVACE. **Conclusão:** Éssencial, portanto, que o aprendizado da Manobra de Heimlich seja difundido de forma mais acentuada para as pessoas que ainda não tem conhecimento sobre ela, visto que se mais pessoas tiverem experiência na prática desta manobra o número de crianças vítimas de sequelas ou óbito devido ao engasgo irá diminuir de forma exponencial.

Palavras-chave: OVACE. Pediatria. Emergência.



SALA DE ESPERA COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CAMPO DA ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER

Camila de Oliveira Prata Pessoa, Paulo Henrique Santos Nascimento, Bianca
Fonseca de Araújo, Durval de Brito Neto, Débora Oliveira dos Santos &
Yoshyara da Costa Anacleto Estrela

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

O câncer de mama apresenta elevada incidência, ocupando a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. Nesse contexto, é importante incentivar a prevenção do câncer de mama a partir da promoção da saúde abordando as mudanças de hábitos de vida, como também as maneiras de detectar precocemente as lesões malignas para melhorar o prognóstico da doença. Trata-se de um estudo descritivo que objetiva relatar a experiência de alunos de Medicina no planejamento e na apresentação de uma sala de espera sobre “Saúde da Mulher e Prevenção do Câncer de Mama” desenvolvida para mulheres de uma Unidade Básica de Saúde, localizada em Patos-PB. Foram realizadas reuniões para discussão do assunto e da metodologia utilizada para exposição do tema. As informações foram transmitidas de forma simples e atrativa, com utilização de folders e simuladores para autoexame, proporcionando ao público um maior conhecimento de seu corpo ressaltando a adoção de cuidados em sua rotina. Além disso, foram desmistificados os principais tabus acerca do tratamento do câncer de mama e a importância da procura por atendimento médico, frisando-se a relevância da identificação precoce de qualquer alteração. Concluiu-se que o momento foi bastante oportuno, pois as participantes tiveram a chance de expor suas inquietações e dúvidas as quais foram respondidas com uma linguagem acessível. A atividade foi de suma importância para os facilitadores uma vez que proporcionou a prática em educação em saúde e promoveu interação acadêmicos-comunidade.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Câncer de Mama; Prevenção.



SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NO MUNICÍPIO DE CAICÓ: EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE OS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DE LONGA DURAÇÃO

Eulâmpio Dantas Segundo, Luiz Paulo Gomes dos Santos Rosa, Alisson Costa
de Araújo, Anna Suzi Jales, Gabriela Aparecida de Oliveira & Maria Isabele
Oliveira Sousa

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

RESUMO

O planejamento reprodutivo continua sendo um desafio no Brasil, com altas taxas de gravidezes não planejadas, contribuindo para um grande impacto na mortalidade materna no país. A maioria destas mulheres fazem o uso dos anticoncepcionais orais, sendo necessário o investimento em educação e saúde nos métodos de longa duração. Este projeto tem como principal objetivo a comunicação e apoio em educação para profissionais da atenção básica e mulheres assistidas pela rede de serviços de saúde de Caicó, promovendo o direito sexual reprodutivo, constituindo a manutenção da oferta do DIU e esclarecimentos social de dúvidas pertinentes a saúde da mulher, cuidado que foi bastante negligenciado durante a pandemia do COVID-19. O projeto possui três frentes de ações, sendo a primeira frente relacionada ao fortalecimento da educação popular e da comunicação social entre as mulheres no seu direito ao planejamento sexual/reprodutivo e os profissionais de saúde e estudantes da Escola Multicampi de Ciências Médicas participantes do projeto. A segunda frente está relacionada com a educação permanente de profissionais da atenção básica do município, além dos residentes de MFC locados no município, fornecendo uma capacitação desde a educação em saúde até implantação e manutenção sobre o método de longa duração. A terceira frente está focada no diálogo intenso com a gestão de saúde para um planejamento longitudinal e que garanta a criação de um protocolo de atendimento e fluxos sobre a inserção de DIU no município. Esperamos atingir as mulheres de Caicó, promovendo seu autocuidado, dos familiares e da comunidade seridoense.

Palavras-chave: Saúde sexual e reprodutiva; Saúde da mulher; DIU; Métodos de longa duração; Educação Popular.

SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO ENSINO DE HUMANIDADES MÉDICAS POR ESTUDANTES DE MEDICINA DO UNIFIP

Vamberto Fernandes Spinelli Junior, Gabryela Canuto Nepomuceno & Maria
Jamilly Batista Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: aprender sentidos atribuídos ao ensino de Humanidades Médicas (HM) por estudantes do Curso de Medicina do Centro Universitário de Patos. As experiências de ensino-aprendizagem das HM demandam uma reflexão permanente sobre o processo pedagógico e sobre sua recepção nas escolas médicas. Método: a pesquisa abarca a perspectiva do estudante. Consiste em um estudo qualitativo cuja coleta de dados ocorreu mediante aplicação de questionário. Os sujeitos de pesquisa foram selecionados por sorteio; 27 estudantes de 6 períodos letivos. Os questionários foram disponibilizados por correspondência eletrônica juntamente com o TCLE. Os dados foram analisados através da técnica de análise de conteúdo de Bardin. Resultados: foram estabelecidas as seguintes categorias: (1) Fatores de adesão às HM: adesão à medicina centrada na pessoa; insatisfação com uma medicina técnico-científica. (2) Fatores de desinteresse pelas HM: não valorização dos conteúdos humanísticos; cultura médica assentada no paradigma biomédico; percepção de uma natureza intuitiva das humanidades; origem social do estudante e a preocupação com manutenção de status. (3) Fatores didático-pedagógicos que favorecem a adesão às HM: metodologias de ensino-aprendizagem participativas; estratégias de integração ensino-serviço-comunidade. (4) Aquisição de competências médico-humanísticas: reconhecimento de uma concepção ampliada de saúde-doença, capacidade empática, de escuta e acolhimento, reconhecimento da singularidade do paciente. Conclusões: aspectos particulares da experiência em análise sinalizam potencialidades, como a efetividade da adesão ao ensino e o reconhecimento da aquisição de competências médico-humanísticas, e desafios relacionados tanto a fatores internos à escola médica como externos, referentes à cultura médica dominante.

Palavras-chave: Educação médica; Humanidades Médicas; Estudantes de medicina

BAHE – Brazilian Archives of Health and Environment, v. 3, n. esp. 1 (2022).

ISSN:2675 - 2298

02 A 04 DE JUNHO

2022

<https://bahe.unifip.edu.br>

SÍNDROME DE GARDNER-DIAMOND: UMA ASSOCIAÇÃO COM OS TRANSTORNOS MENTAIS

Jorge Rubens de Sá Marcolino, Guilherme José Spindola Cordeiro & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A Síndrome de Gardner-Diamond é uma patologia caracterizada por lesões cutâneas dolorosas que podem evoluir para púrpuras e equimoses, em um período de vinte e quatro horas, afetando principalmente as extremidades. Destaca-se que a síndrome acomete os indivíduos que estão sob situações de estresse, ansiedade e que possuem outras comorbidades mentais. Além disso, possui ainda uma maior frequência no sexo feminino. **Objetivos:** Analisar a relação entre o desencadeamento da Síndrome de Gardner-Diamond e os transtornos mentais, com base em análise de artigos científicos sobre o tema. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa nos bancos de dados BVS, PubMed e SciELO com os descritores “equimose”, “psicogênica” e “púrpura”, entre os anos de 2015 e 2022, em língua portuguesa e inglesa. **Resultados:** Os pacientes acometidos pela Síndrome de Gardner-Diamond não apresentam alterações nos testes laboratoriais, incluindo os que compõem o coagulograma, constituindo assim em um diagnóstico de exclusão. Porém, todos os indivíduos acometidos pela síndrome supracitada possuem um componente psicogênico como causador ou exacerbador da patologia, tendo como principais fatores associados o estresse pós-traumático e o transtorno de ansiedade. **Considerações Finais:** Com o aumento da quantidade de casos de Síndrome de Gardner-Diamond, são necessários maiores estudos e intervenções terapêuticas que visem à redução da sintomatologia apresentada, além de um acompanhamento psicoterapêutico para as comorbidades mentais associadas.

Palavras-Chave: Equimose. Psicogênica. Púrpura.

TOXOPLASMOSE NA GRAVIDEZ: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL E TRATAMENTO

Raynne Maia Cunha, Rayanne Maia Cunha, Francisco De Assis Remigio III, Carolina Pedrosa Batista, Ana Beatriz Vieira Sousa & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Apresentar a importância do diagnóstico da toxoplasmose no pré-natal e tratamento efetivo, enfatizando os riscos associados à toxoplasmose congênita. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, na qual os bancos de dados do Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e U.S National Library of Medicine and the National Institutes of Health (PUBMED) foram consultados para levantamento de artigos publicados em periódicos indexado, compreendidos no período de 2018 a 2022. Na estratégia de busca, foram utilizados os descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Toxoplasmose”, “Gestante” e “Neonato” empregando-se como critérios de inclusão: artigos em português e inglês, dispostos na íntegra. A amostra final foi composta por 8 artigos. **Resultados:** A toxoplasmose, cujo agente etiológico é o protozoário *Toxoplasma gondii*, apresenta distribuição mundial e alta prevalência sorológica, sendo 90% das infecções assintomáticas devido a efetividade do sistema imunológico. Entretanto, em gestantes pode resultar em uma doença sistêmica grave, acarretando infecção fetal com danos de diferentes níveis de gravidade, dependendo da virulência, resposta imune da mãe e período gestacional. Verificou-se que a toxoplasmose é altamente disseminada, sendo a América do Sul o continente com maior índice de toxoplasmose congênita. Um dos estudos contabilizou 469 crianças doentes. Destas, 57% tiveram o diagnóstico no período pós-natal. Em relação às mães, 44,6% realizaram o pré-natal, porém 22,5% não receberam medicamento para tratamento da toxoplasmose. **Conclusão:** O acompanhamento sorológico das gestantes com toxoplasmose, de forma periódica, durante toda a gestação é crucial, efetivando medidas terapêuticas que visem minimizar a transmissão vertical. Desse modo, a realização do pré-natal e o reconhecimento das gestantes infectadas é imprescindível à prevenção e tratamento em tempo adequado da toxoplasmose congênita, reduzindo as sequelas.

Palavras-chave: Toxoplasmose; Gestante; Neonato.

BAHE – Brazilian Archives of Health and Environment, v. 3, n. esp. 1 (2022).
ISSN:2675 - 2298

02 A 04 DE JUNHO

2022

<https://bahe.unifip.edu.br>

USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA PREVENÇÃO DA ENXAQUECA

Livia Layanne Lopes Fernandes Rodrigues, Eduarda Feitosa Bezerra, Antonio
Campos De Sousa Filho, Laura Mourão Aragão, Daniella Ribeiro Benício
Alexandre & Milena Nunes Alves de Sousa

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Identificar quais os benefícios do uso da toxina botulínica no tratamento da enxaqueca. Método: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica nos bancos de dados e/ou bibliografias virtuais - Biblioteca Virtual em Saúde e Medical Publisher - utilizando, para seleção dos artigos, os Descritores em Ciências da Saúde - “Botulinum Toxins, Type A” e “Migraine Disorders”, unidos pelo operador booleano AND. Os documentos foram datados de 2017 a 2022, nos idiomas inglês e português. Com base nos filtros estabelecidos, foram selecionados dez artigos para a amostra final. Resultados: A enxaqueca é uma das principais causas de incapacidades no mundo. Por ser uma doença tão prevalente várias formas de tratá-la estão sendo pesquisadas, destacando-se o uso da toxina botulínica. Coletando-se os dados, observou-se que em 90% dos artigos analisados a toxina botulínica se mostrou eficaz. O único estudo que demonstrou ineficácia apresentou limitações metodológicas e de seleção da amostra, como o dia em que se iniciava o tratamento, sendo mais eficiente em pacientes que sentem a dor diária. Conclusão: A utilização do botox para fins terapêuticos se mostrou eficaz ao tratamento da enxaqueca crônica e nos casos de cefaleias mensais, sendo recomendado como opção profilática nos quadros enxaquecosos.

Palavras-Chave: Toxinas Botulínicas Tipo A, Transtornos de Enxaqueca, Prevenção de Doenças, Dor.

VARÍOLA DOS MACACOS EM HUMANOS: ABORDAGEM DOS RISCOS DO SURGIMENTO DE EPIDEMIAS

Francisco de Assis Remigio III, Raynne Maia Cunha, Rayanne Maia Cunha,
Carolina Pedrosa Batista, Ana Beatriz Vieira Sousa & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Identificar os riscos iminentes do surgimento de epidemias da varíola dos macacos em humanos. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa, na qual os bancos de dados do Scielo e Pubmed foram consultados para levantamento de artigos publicados em periódicos indexados, compreendidos no período de 2018 a 2022. Na estratégia de busca, foram utilizados os descritores: “Monkeypox”, “Epidemias” e “Fatores de Risco”, empregando-se como critérios de inclusão: artigos em português e inglês, dispostos na íntegra. A amostra final foi composta por 8 artigos. **Resultados:** A varíola do macaco é uma zoonose causada pelo vírus Monkeypox, cuja transmissão ocorre por gotículas respiratórias, contato direto com objetos infectados ou por fluidos corporais. Pode-se observar que o vírus Monkeypox é altamente contagioso, com maior prevalência na África central e ocidental, constituindo foco central da doença. Até 2003, não haviam casos fora da África, entretanto, nos últimos anos alguns surtos vêm sendo identificados. Além disso, há uma crescente de casos na Europa e nos Estados Unidos, tendo a Inglaterra confirmado 20 casos entre os dias 6 e 20 de maio do presente ano, e Portugal com 23 casos confirmados, sendo 14 deles diagnosticados em um único dia. **Conclusão:** O aumento do número de casos da varíola do macaco em humanos caracteriza um problema de saúde pública. Considerando a alta transmissibilidade da doença, com quadros em países distintos, destaca-se o risco de uma pandemia. Desse modo, medidas profiláticas em relação ao combate da disseminação da doença são necessárias para impedir/limitar sua disseminação.

Palavras-chave: Varíola; Epidemia; Humano.

IMPACTOS DA COVID-19 EM PESSOAS COM A SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA

Rayanne Maia Cunha, Rayne Maia Cunha, Francisco de Assis Remígio III,
Monalisa Maria de Souza Fernandes Paulo & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Identificar os impactos da Covid-19 em pacientes com AIDS. Método: Trata-se de uma revisão sistemática, sendo executada uma pesquisa bibliográfica na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), U.S. National Library of Medicine and the National Institutes of Health (PUBMED) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), no período de 2020 a 2022. Para busca dos artigos utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Covid-19”, “Acquired Immunodeficiency Syndrome” unido pelo descritor booleano AND. A amostra final foi composta por 8 artigos relacionados ao tema proposto. Resultados: A Organização Mundial da Saúde no início de 2020, alertou os grupos populacionais atingidos mais gravemente pela Covid-19, dentre esses, pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), destacando-se quadros clínicos variáveis. De acordo com os estudos analisados, os resultados do curso clínico dos pacientes com AIDS infectados por Covid-19 diversificam de infecções assintomáticas à óbito, considerando-se a existência de outras coinfeções ativas. Além disso, também se observou impactos socioeconômicos e mentais agravados pelo isolamento, explanando inclusive a falta de adesão ao tratamento da AIDS. Verificou-se que, pacientes que não realizaram o tratamento adequado para AIDS, apresentaram quadros de Covid-19 mais graves. Conclusão: Estudos adicionais acerca da relação da Covid-19 em pacientes com AIDS devem ser realizados, visando caracterizar a variação de casos leves a graves. Considerando-se os inúmeros impactos sociais e mentais nestes pacientes, ressalta-se a necessidade de assistência de saúde direcionada para esse grupo.

Palavras-chave: Covid-19; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS); Pandemia; HIV.

BAHE – Brazilian Archives of Health and Environment, v. 3, n. esp. 1 (2022).

ISSN:2675 - 2298

02 A 04 DE JUNHO

2022

<https://bahe.unifip.edu.br>

OS EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE PROBIÓTICOS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA CANDIDÍASE VULVOVAGINAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Paula Karina Gomes da Silva Alves, Vitória Letícia Lima de Andrade, Carolina Pedrosa Batista, Ana Beatriz Vieira Sousa, Nayra Delany de Amorim Alves & Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A candidíase vulvovaginal (VVC) é classificada como a segunda causa de infecção genital entre as mulheres. Manifesta-se como mudanças na secreção vaginal, coceira e irritação. Apesar do tratamento tópico se mostrar bastante eficaz, na maioria das mulheres, ainda há a necessidade de ampliar as opções terapêuticas devido aos mecanismos de resistência e aos diversos fatores que desencadeiam esse quadro. **Objetivo:** Identificar os efeitos da administração de probióticos como forma de prevenção e tratamento da VVC. **Metodologia:** O estudo se trata de uma revisão integrativa em que foi realizada a busca nas bases de dados Publisher Medline e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores “Vaginal candidiasis”, “Probiotics”, “Prevention” os quais foram cruzados por meio do operador booleano “AND”. A partir dos critérios de elegibilidade foram pré-selecionados 71 artigos, e a amostra final se constituiu de 42 documentos nos idiomas inglês, espanhol e português, e no período de publicação compreendido entre os anos de 2012 e 2022. **Resultados:** Evidências crescentes demonstraram a utilidade potencial dos probióticos na prevenção e gestão da candidíase vulvovaginal nos últimos anos. Notou-se a redução do número de bactérias nocivas, mantendo o microambiente ácido, inibindo a resposta imune e acelerando o processo de restauração da microbiota vaginal. Além disso, a taxa de cura clínica a curto prazo aumentou significativamente com o uso do probiótico como adjuvantes para drogas antifúngicas. **Conclusões:** Apesar de muito eficaz na prevenção da VVC o uso dos probióticos isoladamente não é suficiente para a cura da infecção.

Palavras-chave: Microbiota; Infecção genital; Antifúngicos.



DIAGNÓSTICO DA LESÃO PULMONAR ASSOCIADA AO USO DE CIGARRO ELETRÔNICO (EVALI) NO CENÁRIO DE PANDEMIA POR COVID-19: REVISÃO INTEGRATIVA

Nayra Delany de Amorim Alves, Paula Karina Gomes da Silva Alves, Vitória
Letícia Lima de Andrade, Carolina Pedrosa Batista, Eduarda Valadares Ribeiro
Caetano & Everson Vagner de Lucena Santos

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: A EVALI caracteriza-se como uma doença do trato respiratório que causa resposta inflamatória e lesão pulmonar aguda. Geralmente, os pacientes apresentam tosse, dispneia, dor torácica e sintomas sistêmicos, como febre e perda de peso. Ela está associada ao uso de cigarros eletrônicos, conhecidos como “vaping” e vem ganhando notoriedade nos últimos anos. Além disso, nota-se que tal consumo coincidiu com o cenário pandêmico da Covid-19, a qual possui sintomatologia e achados radiológicos semelhantes, gerando, muitas vezes, dificuldade no diagnóstico de ambas. **Objetivo:** Avaliar a similitude dos achados clínicos no diagnóstico da EVALI e da Covid-19. **Método:** O presente estudo consiste em uma revisão integrativa, na qual foi realizada a busca na base de dados PubMed, utilizando os descritores “Evali”, “Covid-19” e “Diagnostic”, os quais foram cruzados por meio do operador booleano “AND”. A amostra final resultou em 19 publicações selecionadas, compreendidas entre 2012 e 2022, no idioma inglês. **Resultados:** Evidências demonstram que apesar de apresentarem diferentes etiologias, a pneumonia causada pela Covid-19 e a lesão pulmonar associada ao cigarro eletrônico possuem achados sobrepostos. Desse modo, observa-se sintomas respiratórios, gastrointestinais e achados radiológicos, como pneumonia em organização, nas duas patologias. Outrossim, alguns estudos apontam que indivíduos em uso de “vaping” podem estar mais susceptíveis a desenvolverem infecção por Covid-19. **Conclusão:** A preocupação dos órgãos de saúde com a pandemia gerou diagnósticos tardios de EVALI, considerando a semelhança entre as sintomatologias. Assim, vê-se a necessidade de uma história clínica mais detalhada, visando à obtenção do diagnóstico diferencial e o tratamento adequado.

Palavras-chaves: Trato respiratório; Drogas lícitas; Coronavírus.



RASTREIO EPIDEMIOLÓGICO DA ADESÃO AO TRATAMENTO DA HANSENÍASE NO ESTADO DA PARAÍBA

Renilson Douglas Fernandes Ferreira; Bruna Sayonara Moura de Farias;
Hirisleide Bezerra Alves

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Objetivo: Analisar a adesão ao tratamento da Hanseníase e a sua relação com a taxa de cura da doença no estado da Paraíba. **Método:** Foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo, a partir da plataforma do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram analisadas as categorias da taxa de cura e do abandono do tratamento dos pacientes com hanseníase no estado da Paraíba nos anos de 2019 e 2020. **Resultados:** A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*, verificando-se diagnóstico essencialmente clínico e possui cura, quando aderido o tratamento correto. Constatou-se que houve um aumento da taxa de abandono no tratamento da Hanseníase no estado da Paraíba, aumentado de 3,7% para 4,5% de 2019 para 2020. Além disso, o percentual de cura também sofreu redução, caindo de 76,2% para 72,4%, o que caracteriza uma consequência da redução da adesão ou do abandono do tratamento. **Conclusão:** Constata-se que a longitudinalidade do sistema de saúde é fundamental para que a doença seja diagnosticada e tratada corretamente. É essencial que haja uma equipe empenhada no acompanhamento do paciente em tratamento da Hanseníase, pois, caso haja abandono do tratamento, o paciente pode infectar outras pessoas, além de não obter a cura, o que pode levar a quadros severos da doença. Portanto, fica provado que a descontinuidade do tratamento está diretamente relacionada a uma menor taxa de cura e possíveis aumentos nas taxas de transmissão de tal doença.

Palavras-chave: Hanseníase; Adesão do Paciente; Método Epidemiológico.



MELHORIA NO PROCESSO DO ENSINO- APRENDIZADO INDIVIDUALIZADO NAS MONITORIAS DE FISIOLOGIA

Pedro Gomes Vieira de Oliveira, Izabelly Fereira de Andrade, Layssa
Machado Alves & Giselle Medeiros Da Costa One

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

Introdução: Dá-se o nome monitoria à modalidade de ensino onde há o aumento da aprendizagem de forma colaborativa, a qual é liderada por alunos regularmente matriculados academicamente ou por membros do corpo discente institucional. Além disso, há diversos métodos que podem ser utilizados para melhorar a relação ensino-aprendizado individual, atingindo não só exposições interativas, como também horas disponíveis para checagens de conhecimento individual e explicação de dúvidas subsequentes. **Objetivo:** Avaliar a o desempenho dos alunos no processo do ensino-aprendizado nas monitorias da disciplina Fisiologia utilizando o momento individualizado para dúvidas e testes de aprendizagem. **Método:** Foi realizada uma pesquisa exploratória, através de aplicação de questionários com alunos que cursavam o primeiro período do curso de Medicina no semestre de 2021.2 do Centro Universitário de Patos-PB (UNIFIP). **Resultado:** Diante da pesquisa realizada, foi notório o aumento do desempenho cognitivo dos alunos que utilizavam dos momentos individualizados disponibilizados. Além disso, foi evidenciado que os testes de aprendizagem realizados neste recurso foram de suma importância para o desempenho dos alunos. **Conclusão:** É de suma importância que haja momentos individuais para os alunos, abrangendo dúvidas oportunas dos mesmos ou testes de aprendizagem, desta maneira havendo uma maior interação com seus monitores e consequentemente aumentando o aprendizado dos alunos.

Palavras-chave: Ensino individual; Monitoria; Medicina.



EVIDÊNCIAS DO USO DA ADRENALINA NO MANEJO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM ADULTOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Suetya Rayane Cavalcante Barreto Góes, Tássio César Silva
Albuquerque Cunha, Larissa Karla Dantas Marques, Lucas Lemuel David
de Oliveira Silva, Ana Carolina Policarpo Nascimento & Adriana Amorim
de Farias Leal

Centro Universitário de Patos (UNIFIP)

RESUMO

cardiorrespiratória em adultos e a sua relação com o aumento ou diminuição da sobrevida pós-parada. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, sendo realizada uma pesquisa bibliográfica entre o período de 2020 e 2021 na plataforma do Pubmed pelos termos correspondentes: cardiac arrest, mortality, epinephrine, adrenaline. Através da estratégia de busca e aplicação dos critérios de inclusão, a amostra da revisão integrativa ficou constituída de 3 artigos. Resultados: Entre os estudos analisados, a maioria descreveu diminuição da sobrevida pós-parada associada ao uso de adrenalina (66,67%; n=2). A relação entre o uso de adrenalina durante a ressuscitação e a diminuição da sobrevida em 7 dias foi encontrada em pacientes com parada cardíaca fora do hospital após trauma. Em relação ao aumento da sobrevida pós-parada, apenas uma metanálise em ensaios clínicos randomizados, que avaliaram vasopressores em adultos com parada cardíaca, relatou que uma combinação de adrenalina, vasopressina e metilprednisolona foi associada à melhora da sobrevida com um bom diagnóstico neurológico. Conclusão: Foi possível verificar um déficit no que diz respeito a ensaios clínicos randomizados sobre o assunto, culminando com a ausência de evidências significativas para apoiar ou desencorajar o uso de adrenalina durante a parada cardíaca. Embora a maioria dos estudos tenham demonstrado que o uso da adrenalina no cenário de PCR tenha relação com diminuição da sobrevida, perceberam-se muitas lacunas e limitações, tornando os estudos inconclusivos.

Palavras-chave: Parada cardíaca; Mortalidade; Epinefrina; Adrenalina.



BAHE – Brazilian Archives of Health and Environment, v. 3, n. esp. 1 (2022): 64-120.

ISSN: 2675-2298

<https://bahe.unifip.edu.br>

6°

SIMPÓSIO PARAIBANO DE
MEDICINA
DA FAMÍLIA E COMUNIDADE

PAINEL INTEGRADO DE
MEDICINA

1º ENCONTRO DE
EGRESSOS

02, 03 e 04
JUNHO

AUDITÓRIO MASTER | BLOCO 6

FORMAÇÃO E RESILIÊNCIA NA EDUCAÇÃO MÉDICA

